

# रक्त ग्लूकोज निरीक्षण र इन्सुलिन प्रबन्धको अवधिमा संक्रमण रोकथाम

रक्त ग्लूकोज निरीक्षणसँग सम्बन्धित संक्रमणहरू नियमितता बढाउन विशेषगरी नर्सिङ होम, सम्बद्ध जीवनयापन र आधारभूत स्याहार सुविधास्थल जस्ता दीर्घकालीन स्याहार सेटिङमा निवासीहरूलाई रक्त ग्लूकोज स्तर निरीक्षण र इन्सुलिन प्रबन्ध गर्न मद्दत चाहिने गरेको पाइएको छ । यस्ता प्रकारका किर्याकलापमा सहयोग गर्ने स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकहरूले सधैं उत्कृष्ट अभ्यासहरू पालना गर्नुपर्छ ।



## फिङ्गरस्टिक उपकरणहरू

- एकजना मात्र व्यक्तिलाई फिङ्गरस्टिक उपकरणहरू प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध गर्नुहोस् । ती उपकरण एकजनाभन्दा धेरै व्यक्तिलाई प्रयोग गरिनुहुँदैन । स्थायी रूपमा पन्चर गर्दा फेरि उस्तै हुने एकपटक मात्र प्रयोग गर्ने ल्यान्सेटहरू चयन गर्नुहोस् । यसले बिरामी र प्रदायकलाई अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
- प्रयोग गरिएका ल्यान्सेटहरू प्रयोग गर्दा अनुमोदित तिखा वस्तुहरू फाल्ने कन्टेनरमा फाल्नुहोस् । ल्यान्सेटहरू कहिल्यै पनि फेरि प्रयोग नगर्नुहोस् ।

## रक्त ग्लूकोज मिटर

- सम्भव हुँदासम्म, रक्त ग्लूकोज मिटरहरू एकजना व्यक्तिलाई मात्र निर्दिष्ट गर्नुपर्छ र शेयर गर्नुहुँदैन ।
- रक्त ग्लूकोज मिटरहरू शेयर गर्नुपरेमा, उक्त उपकरणमा रगत र संक्रमित कारकहरू नजमोस् भन्का लागि उत्पादकका निर्देशनहरू अनुसार त्यसलाई हरेक पटक प्रयोग गरेपछि सफा गरेर कीटाणुमुक्त बनाउनुपर्छ । उत्पादकले उक्त उपकरण कसरी सफा र कीटाणुमुक्त बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख नगरेमा यसलाई शेयर गर्नुहुँदैन ।

## सामान्य

- प्रयोग नगरिएका सामग्री र औषधिहरू प्रयोग गरिएका सामग्री र उपकरण (जस्तै, ग्लूकोज मिटरहरू) बाट छुट्टै सफा क्षेत्रमा राख्नुपर्छ ।
- सामग्री र औषधिहरू खल्तीमा नबोक्नुहोस् ।

## इन्सुलिन प्रबन्ध

- इन्सुलिन पेनहरू एकजना व्यक्तिलाई एउटा गरेर निर्दिष्ट गर्नुपर्छ र राम्रोसँग लेबल लगाउनुपर्छ । ती उपकरण एकजनाभन्दा धेरै व्यक्तिलाई प्रयोग गरिनुहुँदैन ।

## हातको सरसफाई

- निवासीलाई छुनुअघि र पञ्जाहरू लगाउनुअघि हात धुनुहोस् ।
- रक्त ग्लूकोज निरीक्षण र रगत वा शरीरका तरल पदार्थहरूको सम्पर्कमा आउन सक्ने अन्य कुनै पनि कार्यविधिको अवधिमा पञ्जाहरू लगाउनुहोस् ।
- एकदेखि अर्को निवासीको सम्पर्कमा आउँदा पञ्जाहरू परिवर्तन गर्नुहोस् । सफा सतहहरू छुनुअघि रगत भएको दूषित वस्तु वा फिङ्गरस्टिक घाउहरू छोएको पञ्जाहरू परिवर्तन गर्नुहोस् । पञ्जाहरू उपयुक्त डिब्बाहरूमा फाल्नुहोस् ।
- पञ्जाहरू खोल्दा बित्तिकै र अर्को व्यक्तिमाथि प्रयोग गर्न अभिप्रेरित अन्य चिकित्सा सामग्रीहरू छुनुअघि तुरुन्तै हात धुनुहोस् ।

रक्त ग्लूकोज निरीक्षण र इन्सुलिन प्रबन्धको अवधिमा संक्रमण रोकथामबारे थप जानकारीका लागि, <https://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html> मा जानुहोस्